

**AVALIAÇÃO DOS ÓBITOS POR CAUSA NATURAL OU NÃO NATURAL COM  
O DIAGNÓSTICO DE CISTICERCOSE/NEUROCISTICERCOSE NO RIO  
GRANDE DO SUL INFORMADOS A SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE  
NO PERÍODO DE 1998 A 2007**

**LISBÔA, M. M.**<sup>1\*</sup>

**CRUZ, L. L.**<sup>2</sup>

**ESTIMA, C. L. W.**<sup>3</sup>

**OLIVEIRA, V. C.**<sup>4</sup>

**NÚCLEO DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE/SES**<sup>5</sup>

**CALDAS, E. P.**<sup>6</sup>

**CALDEIRA, K. V.**<sup>7</sup>

**INTRODUÇÃO:** A Cisticercose e a Neurocisticercose são parasitoses causadas pela ingestão dos ovos da *Taenia solium* os quais ocupam tecidos corporais ou órgãos e/ou Sistema Nervoso Central. No Brasil, a endemidade acomete em pessoas nas zonas rurais. A qualidade de vida nas zonas urbanas está diminuindo em relação à zona rural.

**OBJETIVOS:** Avaliar dados gerais dos óbitos informados à SES/RS, no período de 1998 a 2007, causados por Cisticercose/Neurocisticercose.

**METODOLOGIA:** Foram consultadas declarações de óbitos, Fichas Epidemiológicas para Cisticercose/SINAN, Fichas do SIM-Sistema de Informações de Mortalidade e 1 laudo de necropsia (único óbito por causa não natural). Não computamos duplamente os óbitos informados pelos sistemas. Para fins de análise estatística, aglutinamos as ocupações em: rurais, industriais e as por afinidades dos serviços (como doméstica, dona de casa, do lar e faxineira).

**RESULTADOS:** No RS, ocorreram 44 óbitos pelas causas de Cisticercose ou Neurocisticercose. Por Neurocisticercose (CID - B69.9) ocorreram 38 óbitos (sendo 25 casos femininos e 13 casos masculinos). Por Cisticercose Não Especificada (CID - B69.9) ocorreram 3 óbitos masculinos e 1 feminino. Por Pneumocisticercose (CID B69.8) houve 1 óbito masculino. Por Cisticercose no fígado (descoberto em necropsia) houve 1 óbito masculino. Quanto às ocupações aglutinadas, foram diagnosticados na seguinte ordem: serviços domésticos (12 óbitos=27,27%, sendo 11 urbanos e 1 rural. Idades: 35 a 82 anos); aposentados (9 óbitos. Idades: 41 a 71 anos) e trabalhadores rurais (8 óbitos. Idades: 43 a 87 anos). O gênero feminino prevaleceu com 26 óbitos (59,09%) sobre o masculino com 18 óbitos (40,90%). Um óbito foi por causa não natural (explosão de um silo) e 43 (=97,73%) por causa natural (doença ou estado mórbido).

**CONCLUSÕES:** A análise dos dados obtidos com relação ao local de residência, ao gênero e às ocupações surpreendeu mostrando um número maior de óbitos em residentes em áreas urbanas, do gênero feminino e com ocupação nos serviços domésticos. Provavelmente, a qualidade da vida urbana referente à saúde está diminuindo em relação à rural, pois onde deveria haver saneamento e melhor acesso às unidades de saúde não é onde estão os melhores índices de mortalidade em relação as parasitoses da Cisticercose/Neurocisticercose. Mais estudos são necessários para sabermos a que são devidos os melhores resultados nas zonas rurais.

